



Para los adultos con enfermedad renal crónica (ERC), FARXIGA® (dapagliflozin) es un medicamento de venta con receta aprobado para disminuir el riesgo de un mayor empeoramiento de la enfermedad renal, enfermedad renal terminal, muerte por enfermedad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca.

EMPIEZA LA CONVERSACIÓN

Habla con tu médico sobre la conexión entre la enfermedad renal crónica y la diabetes tipo 2 o la presión arterial alta. FARXIGA no es un medicamento para la presión arterial.



4 preguntas importantes que se deben hacer:

- 1 Si tengo diabetes tipo 2 o presión arterial alta, es posible que ya tenga la enfermedad renal crónica (ERC) y no lo sepa. ¿Cómo puedo saber si tengo la ERC?
- 2 ¿Cuáles son mis números renales y qué significan?
¿Por qué debería preguntar sobre ellos en cada visita?
- 3 Si me diagnostican la ERC, ¿cómo puede ayudarme FARXIGA?
- 4 ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de FARXIGA?

Usos aprobados para FARXIGA® (dapagliflozin)

¿Qué es FARXIGA?

FARXIGA es un medicamento de venta con receta que se usa para lo siguiente:

- Mejorar el control del azúcar en sangre junto con la dieta y el ejercicio en adultos con diabetes tipo 2.
- Reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular conocida o múltiples factores de riesgo cardiovascular.
- Disminuir el riesgo de muerte cardiovascular, la hospitalización y visita urgente por insuficiencia cardíaca en adultos con insuficiencia cardíaca, es decir, cuando el corazón no puede bombear sangre suficiente al resto del cuerpo.
- Disminuir el riesgo de un mayor empeoramiento de la enfermedad renal, enfermedad renal terminal, muerte por enfermedad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca en adultos con enfermedad renal crónica.

FARXIGA no está indicado para mejorar el control del azúcar en sangre (glucosa) en personas con diabetes tipo 1.

FARXIGA no está indicado para mejorar el control del azúcar en sangre (glucosa) en adultos con diabetes tipo 2 que tienen problemas renales de moderados a graves, porque es posible que no funcione.

FARXIGA no es para personas con ciertas formas genéticas de poliquistosis renal o que estén tomando o hayan recibido recientemente terapia inmunodepresora para tratar la enfermedad renal. No se espera que FARXIGA funcione si presentas estas afecciones.

Información de seguridad importante

¿Quiénes no deberían tomar FARXIGA?

No tomes FARXIGA si eres alérgico al dapagliflozin o a cualquiera de los ingredientes de FARXIGA. Los síntomas de una reacción alérgica **grave** pueden incluir sarpullido, manchas rojas elevadas en la piel (urticaria), hinchazón de la cara, los labios, la lengua y la garganta que puede causar dificultad para respirar o tragar. Si presentas alguno de estos síntomas, deja de tomar FARXIGA y comunícate con tu proveedor de atención médica o acude a la sala de emergencias del hospital más cercano de inmediato.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de FARXIGA?

FARXIGA puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Cetoacidosis.** FARXIGA puede causar cetoacidosis, una afección grave que puede requerir hospitalización y provocar la muerte. Las personas con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o problemas de páncreas tienen un alto riesgo de contraer cetoacidosis. Los signos y síntomas pueden incluir náuseas, cansancio, vómitos, dificultad para respirar, dolor abdominal y cetonas en la orina o la sangre. Si presentas alguno de estos síntomas, deja de tomar FARXIGA y llama de inmediato a tu proveedor de atención médica. Si es posible, controla la presencia de cetonas en la orina o la sangre, incluso si tu nivel de azúcar en la sangre es inferior a 250 mg/dl.
- **Deshidratación** (la pérdida de agua corporal y sal), que puede hacer que te sientas mareado, débil, aturdido, o provocar una sensación de desvanecimiento, especialmente al ponerte de pie (hipotensión ortostática). Hubo informes de daño renal repentino en personas con diabetes tipo 2 que toman FARXIGA. Puedes tener un mayor riesgo de deshidratación si tomas medicamentos para reducir la presión arterial, incluidos diuréticos; tienes 65 años o más; estás siguiendo una dieta baja en sal o tienes problemas renales. Habla con tu proveedor de atención médica sobre lo que puedes hacer para prevenir la deshidratación, incluida la cantidad de líquido que debes beber a diario. Llama a tu proveedor de atención médica de inmediato si reduces la cantidad de alimentos o líquidos que bebes, o si experimentas vómitos o diarrea.
- En personas que tomaban FARXIGA, se produjeron **infecciones graves del tracto urinario (ITU)**, entre las cuales algunas condujeron a la hospitalización. Informa a tu proveedor de atención médica si presentas algún signo o síntoma de ITU, como una sensación de ardor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia, necesidad de orinar de inmediato, dolor en la parte baja del abdomen (pelvis), sangre en la orina con o sin fiebre, dolor de espalda, náuseas o vómitos.
- Es posible que se produzca **un nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia)** si tomas FARXIGA con otro medicamento que pueda causar un nivel bajo de azúcar en la sangre, como las sulfonilureas o la insulina. Los síntomas de un nivel bajo de azúcar en sangre incluyen temblores, sudoración, ritmo cardíaco acelerado, mareos, hambre, dolor de cabeza e irritabilidad. Sigue las instrucciones de tu proveedor de atención médica para tratar la hipoglucemia.
- **Infecciones bacterianas debajo de la piel de los genitales y las áreas que los rodean.** Con FARXIGA, se han producido infecciones raras pero graves que causan daños graves en los tejidos debajo de la piel de los genitales y las áreas que los rodean. Esta infección ha ocurrido en mujeres y hombres, y puede provocar hospitalizaciones, cirugías y la muerte. Busca atención médica de inmediato si tienes fiebre o si te sientes muy débil, cansado o incómodo, y también si presentas dolor o sensibilidad, hinchazón o enrojecimiento de la piel de los genitales y las áreas alrededor de estos.
- **Infecciones vaginales por hongos** en mujeres que toman FARXIGA. Consulta a tu proveedor de atención médica si tienes olor vaginal desagradable, secreción vaginal blanca o amarillenta (la secreción puede tener grumos o parecerse a un requesón) o picazón vaginal.
- **Infección por hongos en la piel alrededor del pene (balanitis)** en hombres que toman FARXIGA. Consulta a tu proveedor de atención médica si experimentas enrojecimiento, picazón o hinchazón del pene; erupción en el pene; secreción del pene con olor desagradable; o dolor en la piel alrededor del pene. Algunos hombres no circuncidados pueden tener hinchazón del pene, lo que dificulta la retracción de la piel alrededor de la punta del pene.

Los efectos secundarios más frecuentes de FARXIGA incluyen infecciones por hongos de la vagina o el pene, y cambios al orinar, como la necesidad urgente de orinar con más frecuencia, en mayor cantidad o por la noche.

¿Qué debo comunicarle a mi proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar FARXIGA?

Antes de tomar FARXIGA, infórmale a tu proveedor de atención médica lo siguiente:

- **Todas tus afecciones médicas**, incluidos los problemas de hígado o páncreas.
- **Si has tenido cetoacidosis diabética.**
- **Si tienes** diabetes tipo 1, disminución de la dosis de insulina, infección grave, antecedentes de infección de la vagina o el pene, antecedentes de infecciones de las vías urinarias o problemas para orinar.
- **Si sigues** una dieta baja en sodio, vas a someterte a una cirugía, comes menos o cambias de dieta, estás deshidratado o bebes en exceso.
- **Si estás embarazada o planeas quedar embarazada.** FARXIGA puede dañar al feto.
- **Si estás amamantando o planeas hacerlo.** Se desconoce si FARXIGA pasa a la leche materna.
- **Sobre todos los medicamentos que tomas**, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Consulta la [Información de prescripción completa](#) y la [Guía del medicamento](#) de FARXIGA.

Puedes [informar los efectos secundarios relacionados con productos de AstraZeneca](#).

FARXIGA es una marca comercial registrada del grupo de compañías AstraZeneca.