



Vivir con insuficiencia cardíaca



¿Qué es la insuficiencia cardíaca?


La insuficiencia cardíaca se produce cuando el corazón no puede bombear sangre tan bien como debería. A diferencia de un ataque cardíaco, la insuficiencia cardíaca ocurre lentamente. Es una afección crónica que empeora con el tiempo.

En adultos con insuficiencia cardíaca, la sangre puede comenzar a acumularse, y las venas, los tejidos y los pulmones se llenan de líquido. Esto puede hacer que sientas que te falta el aire y puede causar hinchazón en las piernas y los pies.

Una mirada en detalle a la insuficiencia cardíaca

Los médicos utilizan algo denominado *fracción de eyección* para ayudar a determinar qué tipo de insuficiencia cardíaca tienes y qué tan grave es. Una fracción de eyección es una medida (en porcentaje) de cuánta sangre bombea el corazón al resto del cuerpo con cada contracción.

Existen diferentes tipos de insuficiencia cardíaca, entre los que se incluyen los siguientes:



Corazón con HFrEF
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida

Lo que significa:

El músculo cardíaco está debilitado, por lo que no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo

Cuando el corazón se contrae:

Logra bombear cerca del 40%, o menos, de la sangre en su interior

Lo que puedes sentir:

Incluso en reposo puedes sentir síntomas



Corazón con HFpEF
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada

Lo que significa:

El músculo cardíaco se vuelve rígido y no puede llenarse adecuadamente, por lo que bombea menos sangre al cuerpo

Cuando el corazón se contrae:

Logra bombear cerca del 50% al 70% de la sangre en su interior

Lo que puedes sentir:

Durante la actividad, es posible que no notes síntomas

¿Qué causa la insuficiencia cardíaca?

Los factores de riesgo frecuentes incluyen los siguientes:

- Presión arterial elevada
- Edad avanzada
- Obesidad
- Enfermedad renal crónica
- Diabetes
- Fumar

¿Por qué mi médico me recetó FARXIGA® (dapagliflozin)?

RECOMENDADO POR EXPERTOS FARXIGA pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de SGLT2, que se recomiendan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, independientemente del tipo de insuficiencia cardíaca que tengas.

FARXIGA es un medicamento con receta que se utiliza para reducir el riesgo de muerte por causas cardiovasculares, hospitalización por insuficiencia cardíaca y visitas de urgencia por insuficiencia cardíaca en adultos con insuficiencia cardíaca en casos en que el corazón no puede bombear suficiente sangre al resto del cuerpo.

FARXIGA es una pequeña pastilla comprobada que ayuda a:



Permitir que vivas tu vida al reducir el riesgo de muerte cardiovascular



A reducir el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca



A reducir el riesgo de visitas de urgencia por insuficiencia cardíaca

Información de Seguridad Importante sobre FARXIGA

¿Quiénes no deberían tomar FARXIGA?

No tomes FARXIGA si eres alérgico al dapagliflozin o a cualquiera de los ingredientes de FARXIGA. Los síntomas de una reacción alérgica **grave** pueden incluir sarpullido, manchas rojas elevadas en la piel (urticaria), hinchazón de la cara, los labios, la lengua y la garganta que pueden causar dificultad para respirar o tragar. Si presentas alguno de estos síntomas, deja de tomar FARXIGA y comunícate con tu proveedor de atención médica o acude a la sala de emergencias del hospital más cercano de inmediato.

Consulta la Información de Seguridad Importante adicional en las páginas 4 a 7 y haz clic [aquí](#) para obtener la Guía del Medicamento de FARXIGA. Para obtener la Información de Prescripción Completa de FARXIGA para EE. UU., haz clic [aquí](#).



¿Cómo funciona FARXIGA?

FARXIGA bloquea parte de la reabsorción de azúcar y sodio en los riñones. El efecto de FARXIGA en los riñones también puede ayudar a mejorar la capacidad del corazón para bombear sangre al cuerpo.

Cómo tomar FARXIGA

FARXIGA es una pastilla que se toma una vez al día con o sin alimentos. Es importante tomar FARXIGA exactamente como te lo indica tu médico.

Información de Seguridad Importante sobre FARXIGA (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de FARXIGA?

FARXIGA puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Cetoacidosis.** FARXIGA puede causar cetoacidosis, una afección grave que puede requerir hospitalización y provocar la muerte. Las personas con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o problemas del páncreas tienen un alto riesgo de contraer cetoacidosis. Los signos y los síntomas pueden incluir náuseas, cansancio, vómitos, dificultad para respirar, dolor abdominal y cetonas en la orina o la sangre. Si presentas alguno de estos síntomas, deja de tomar FARXIGA y llama de inmediato a tu proveedor de atención médica. Si es posible, verifica la presencia de cetonas en la orina o la sangre, incluso si tu nivel de azúcar en la sangre es inferior a 250 mg/dl.
- **Deshidratación** (la pérdida de agua corporal y sal), que puede hacer que te sientas mareado, débil, aturdido, o provocar una sensación de desvanecimiento, especialmente al ponerte de pie (hipotensión ortostática). Hubo informes de daño renal repentino en personas con diabetes tipo 2 que toman FARXIGA. Puedes tener un mayor riesgo de deshidratación si tomas medicamentos para reducir la presión arterial, incluidos diuréticos; tienes 65 años o más; estás siguiendo una dieta baja en sal o tienes problemas renales. Habla con tu proveedor de atención médica sobre lo que puedes hacer para prevenir la deshidratación, incluida la cantidad de líquido que debes beber a diario. Llama a tu proveedor de atención médica de inmediato si reduces la cantidad de alimentos o líquidos que bebes, o si experimentas vómitos o diarrea.

Consulta la Información de Seguridad Importante adicional en las páginas 3 y de la 5 a la 7, y haz clic [aquí](#) para obtener la Guía del Medicamento de FARXIGA. Para obtener la Información de Prescripción Completa de FARXIGA para EE. UU., haz clic [aquí](#).

Cómo puedes ayudar a controlar la insuficiencia cardíaca

Sigue tu plan de tratamiento y toma FARXIGA según las indicaciones de tu médico para ayudar a controlar la insuficiencia cardíaca.

Tu plan de tratamiento puede incluir lo siguiente:



Tomar tus medicamentos según lo indicado



Hacer ejercicio con regularidad



Mantener control de tu peso



Seguir una dieta baja en sal



Llevar registro de tus síntomas

Habla con tu médico o con un miembro del personal de enfermería si tus síntomas cambian, o si tienes alguna pregunta o necesitas apoyo.

Información de Seguridad Importante sobre FARXIGA® (dapagliflozin) (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de FARXIGA?

FARXIGA puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- En personas que tomaban FARXIGA, se produjeron **infecciones graves del tracto urinario (ITU)**, entre las cuales algunas condujeron a la hospitalización. Informa a tu proveedor de atención médica si presentas algún signo o síntoma de ITU, como una sensación de ardor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia, necesidad de orinar de inmediato, dolor en la parte baja del abdomen (pelvis), sangre en la orina con o sin fiebre, dolor de espalda, náuseas o vómitos
- Es posible que se produzca un **nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia)** si tomas FARXIGA con otro medicamento que pueda causar un nivel bajo de azúcar en la sangre, como las sulfonilureas o la insulina. Los síntomas de un nivel bajo de azúcar en sangre incluyen temblores, sudoración, ritmo cardíaco acelerado, mareos, hambre, dolor de cabeza e irritabilidad. Sigue las instrucciones de tu proveedor de atención médica para tratar la hipoglucemia

Consulta la Información de Seguridad Importante adicional en las páginas 3 a la 4 y de la 6 a la 7, y haz clic [aquí](#) para obtener la Guía del Medicamento de FARXIGA. Para obtener la Información de Prescripción Completa de FARXIGA para EE. UU., haz clic [aquí](#).

Información de Seguridad Importante sobre FARXIGA® (dapagliflozin) (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de FARXIGA?

FARXIGA puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones bacterianas debajo de la piel de los genitales y las áreas que los rodean.** Con FARXIGA, se han producido infecciones raras pero graves que causan daños graves en los tejidos debajo de la piel de los genitales y las áreas que los rodean. Esta infección ha ocurrido en mujeres y hombres, y puede provocar hospitalizaciones, cirugías y la muerte. Busca atención médica de inmediato si tienes fiebre o si te sientes muy débil, cansado o incómodo, y también si presentas dolor o sensibilidad, hinchazón o enrojecimiento de la piel de los genitales y las áreas alrededor de estos.
- **Infecciones vaginales por hongos** en mujeres que toman FARXIGA. Consulta a tu proveedor de atención médica si tienes olor vaginal desagradable, secreción vaginal blanca o amarillenta (la secreción puede tener grumos o parecerse a un requesón) o picazón vaginal.
- **Infección por hongos en la piel alrededor del pene (balanitis)** en hombres que toman FARXIGA. Consulta a tu proveedor de atención médica si experimentas enrojecimiento, picazón o hinchazón del pene; erupción en el pene; secreción del pene con olor desagradable; o dolor en la piel alrededor del pene. Algunos hombres no circuncidados pueden tener hinchazón del pene, lo que dificulta la retracción de la piel alrededor de la punta del pene.

Los efectos secundarios más frecuentes de FARXIGA incluyen infecciones por hongos de la vagina o el pene, y cambios al orinar, como la necesidad urgente de orinar con más frecuencia, en mayor cantidad o por la noche.

¿Qué debo comunicarle a mi proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar FARXIGA?

Antes de tomar FARXIGA, informa a tu proveedor de atención médica lo siguiente:

- **Todas tus afecciones médicas**, incluidos los problemas de hígado o páncreas.
- **Si has tenido cetoacidosis diabética.**
- **Si tienes** diabetes tipo 1, disminución de la dosis de insulina, infección grave, antecedentes de infección de la vagina o el pene, antecedentes de infecciones de las vías urinarias o problemas para orinar.
- **Si sigues** una dieta baja en sodio, vas a someterte a una cirugía, comes menos o cambias de dieta, estás deshidratado o bebes en exceso.
- **Si estás embarazada o planeas quedar embarazada.** FARXIGA puede dañar al feto.
- **Si estás amamantando o planeas hacerlo.** Se desconoce si FARXIGA pasa a la leche materna.
- **Sobre todos los medicamentos que tomas**, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Consulta la Información de Seguridad Importante adicional en las páginas 3 a la 5 y la 7, y haz clic [aquí](#) para obtener la Guía del Medicamento de FARXIGA. Para obtener la Información de Prescripción Completa de FARXIGA para EE. UU., haz clic [aquí](#).

Usos Aprobados para FARXIGA® (dapagliflozin)

¿Qué es FARXIGA?

FARXIGA es un medicamento de venta con receta que se usa para lo siguiente:

- Mejorar el control del azúcar en sangre junto con la dieta y el ejercicio en adultos y niños de 10 años o más con diabetes tipo 2.
- Reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular conocida o múltiples factores de riesgo cardiovascular.
- Disminuir el riesgo de muerte cardiovascular, la hospitalización y visita urgente por insuficiencia cardíaca en adultos con insuficiencia cardíaca, es decir, cuando el corazón no puede bombear sangre suficiente al resto del cuerpo.
- Disminuir el riesgo de un mayor empeoramiento de la enfermedad renal, enfermedad renal terminal, muerte por enfermedad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca en adultos con enfermedad renal crónica.

FARXIGA no está indicado para mejorar el control del azúcar en sangre (glucosa) en personas con diabetes tipo 1.

FARXIGA no está indicado para mejorar el control del azúcar en sangre (glucosa) en personas con diabetes tipo 2 que tienen problemas renales de moderados a graves, porque es posible que no funcione.

FARXIGA no es para personas con ciertas formas genéticas de poliquistosis renal o que estén tomando o hayan recibido recientemente terapia inmunodepresora para tratar la enfermedad renal. No se espera que FARXIGA funcione si tienes estas afecciones.

Puedes **informar los efectos secundarios relacionados con los productos de AstraZeneca.** 

Si no puedes pagar los medicamentos, AstraZeneca puede ayudarte.
Para obtener más información, visita **www.AstraZeneca-us.com.** 

Consulta la Información de Seguridad Importante adicional en las páginas 3 a 6 y haz clic aquí para obtener la Guía del Medicamento de FARXIGA. Para obtener la Información de Prescripción Completa de FARXIGA para EE. UU., haz clic aquí.


farxiga®
(dapagliflozin) 10mg tablets



Obtén un copago de \$0* para FARXIGA® (dapagliflozin)

- Si tienes un seguro Comercial, puedes pagar desde tan solo \$0* cada mes con la Tarjeta de ahorros de FARXIGA
- 9 de cada 10 pacientes con cobertura Comercial y de la Parte D de Medicare tienen acceso a FARXIGA a nivel nacional†

*Sujeto a elegibilidad. Se aplican restricciones. No está disponible para pacientes asegurados por el gobierno. Tan bajo como \$0 mientras tu médico te recete cualquier dosis disponible de FARXIGA.

†Datos en archivo, US-84194, AstraZeneca Pharmaceuticals, LP.

Visita ahora FARXIGASAVE.com
para registrarte y obtener tu tarjeta de ahorros.

**FARXIGA StartSmart es tu lugar para
obtener datos y educación sobre
FARXIGA.**

Visita FARXIGASmart.com para comenzar hoy.